

اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر*

عاطفه عباسی^۱، اصغر آقایی^۲، حسین ابراهیمی مقدم^۳

Effectiveness of metacognitive therapy on resiliency in the people with generalized anxiety

Atefeh Abbasi¹, Asghar Aghaei², Hosein Ebrahimi Moghadam³

چکیده

زمینه: بروز اختلال اضطراب فراگیر، فرآیندهای روانشناختی، شناختی، ارتباطی و اجتماعی افراد را آسیب جدی مواجه ساخته و تاب آوری آنها را کاهش می دهد. اما آیا درمان فراشناختی به بهبود تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر کمک می کند. **هدف:** بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. **روش:** روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر تهران در سال ۱۳۹۶ بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گمارش تصادفی استفاده شد. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در گروه های آزمایش و گواه، گروه آزمایش مداخله فراشناخت درمانی (ولز، ۲۰۰۹) را در ۱۰ جلسه طی سه ماه به صورت هفتگی یک جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت نمود. پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتر و همکاران، ۲۰۰۶) و تاب آوری (کاتر و دویسون، ۲۰۰۴) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. **یافته ها:** نتایج نشان داد که درمان فراشناختی بر تاب آوری بیماران افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مؤثر بوده است ($P < 0.001$). علاوه بر این نتایج نشان داد که این درمان توانسته تأثیر خود را در زمان نیز به شکل معناداری حفظ نماید ($P < 0.001$). میزان تأثیر آماری درمان فراشناختی بر تاب آوری بیماران افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر ۵۸ درصد بود. **نتیجه گیری:** بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراشناختی با بهره گیری از فنونی همچون به تعویق اندامن نگرانی، چالش با باورهای مربوط به خطر، متوقف کردن مهار رفتارهای اجتنابی، دارای کارآیی بالینی مناسبی در جهت بهبود تاب آوری بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به شمار می رود.

واژه کلیدها: درمان فراشناختی، تاب آوری، اضطراب فراگیر

Background: The incidence of generalized anxiety disorder severely damages individuals' psychological, cognitive, communication and social processes and reduces their resilience. But does meta-cognitive therapy help improve resiliency in people with generalized anxiety disorder? **Aims:** Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of metacognitive therapy on resiliency in the people with generalized anxiety. **Method:** The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period. The statistical population of the study included all the people with social anxiety referring to consultation centers in the city of Tehran in 2017. Non-probable purposive sampling method and random replacement were used in the present study. After selecting the sample size and replacing them into experimental and control groups, the experimental group received 10 ninety-minute sessions of therapy interventions during three months once a week. The applied questionnaires in the study included generalized anxiety questionnaire (Spitzer, et.al, 2006), resiliency (coner, 2004). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA. **Results:** The results of data analysis showed that metacognitive therapy has been effective on resiliency in the patients suffering from generalized anxiety disorder ($P < 0.001$). Moreover the results showed that this therapy could significantly maintain its effect in time ($P < 0.001$). The degree of statistical effect of metacognitive therapy on resiliency in the people with generalized anxiety was 58%. **Conclusion:** Based on the findings of the present study, it can be concluded that metacognitive therapy utilizes techniques such as postponing worry, challenging beliefs about risk, stopping avoidance behaviors, and has appropriate clinical efficacy to improve the resiliency of patients with generalized anxiety disorder. **Key words:** Metacognitive therapy, resiliency, Generalized anxiety

Corresponding Author: aghaeipsy@gmail.com

* این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول است.

۱. دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسکان)، اصفهان، ایران

۱. Ph D student of General Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

۲. استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسکان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول)

۲. Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran(Corresponding Author)

۳. دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

۳. Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodreh Branch, Roodreh, Iran

مقدمه

فراگیر مبتلا می‌شود، میزان نگرانی وی به شدت افزایش یافته (محمودعلیلو و همکاران، ۱۳۹۰) و این فرآیند بهزیستی روانی وی را کاهش می‌دهد. مؤلفه‌های روانشناختی مختلفی هستند که برخورداری از آنها می‌تواند از فرد در برابر آسیب‌های روانشناختی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی محافظت نماید. مؤلفه‌هایی که می‌توان با بکارگیری روش‌های درمانی و آموزشی مناسب، سعی در بهبود آنان جهت برخورداری فرد از قدرت مقابله‌ای بهینه، داشت. یکی از مؤلفه‌های روانشناختی مهم که قدرت مقابله‌ای فرد در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو را بهبود می‌بخشد، تاب‌آوری است (لوا، تیلور و دی‌فولکو، ۲۰۱۸؛ اوشیو، تاکا، هیرانو و سعید، ۲۰۱۸).

تاب‌آوری حفظ شایستگی و صلاحیت در شرایط تهدید آمیز و تندیگی زا و برگشت به حالت اولیه پس از تجربه ضایعه‌ای روانی و برخورداری از رشد مناسب به رغم وجود وضعیت پر خطر، تعریف شده است. میزان تاب‌آوری فرد از طریق تعامل با مشکلات و خطرات و عوامل محافظت کننده فردی تعیین می‌گردد (مالدینگ، پیترز، رابرتر، اثونارد و اسپارکمن، ۲۰۱۲؛ دوستی، پورمحمدی‌ضایی تجربی و غباری‌بناب، ۱۳۹۳). شمار زیادی از پژوهش‌ها حاکی از آنند که تاب‌آوری نقش میانجی بسیار مهمی در بروز اغلب اختلالات روانی داشته و عامل مهمی در تعدادی از گروه‌های در معرض خطر به حساب می‌آید (مايلنت، تی دی و میهن، ۲۰۰۲؛ قلی‌پور، مرعشی، مهرابی‌زاده هترمند و ارشدی، ۱۳۹۵). تاب‌آوری از عواملی است که افراد را در برابر اختلالات آسیب‌شناختی و دشواری‌های زندگی در امان نگاه داشته و به فرد در برخورد و سازگاری با موقعیت‌های دشوار و تندیگی زای زندگی کمک می‌کند (دبیر، لوکاس، شمیک و هلیول، ۲۰۰۹).

تاكنون روش‌های درمانی مختلفی بر مؤلفه‌های روانشناختی افراد مبتلا به اضطراب فراگیر صورت پذیرفته است. یکی از این روش‌ها فراشناخت درمانی است. در سال‌های اخیر فراشناخت به عنوان پایه و اساس بسیاری از اختلال‌های روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته و کارایی آن در درمان آسیب‌های مختلف روانی به خوصوص در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نشان داده شده است (شفیعی شنگ‌آتش، رفیعی‌نیا و نجفی، ۱۳۹۱؛ اصلی‌آزاد، فرامرزی، عارفی، فرهادی و فکار، ۱۳۹۳؛ عاشوری، ۱۳۹۴؛

اضطراب^۱ به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد به حدی اعتدال آمیز وجود دارد و این حد، به عنوان پاسخی سازش‌یافته تلقی می‌شود، اما تا جایی که به اضطراب مرضی تبدیل نشود. اختلال اضطراب فراگیر^۲ یکی از شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی است (لیب، بکر و آلتامارا، ۲۰۰۵؛ امیر، تابوس و مونترو، ۲۰۱۹) که در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، با اضطراب و نگرانی^۳ شدید در مورد چندین رویداد با فعالیت که در اکثر روزها و حداقل ۶ ماه دوام داشته، مهار آن مشکل بوده و با علائم جسمانی نظیر تندیگی عضلانی، تحریک‌پذیری، اشکال درخواب و بی قراری همراه است، تعریف می‌شود (بشارت، حافظی، رنجبر شیرازی و رنجبری، ۱۳۹۷؛ هیز - شلتون، رومر و اورسیلو، ۲۰۱۳).

میزان شیوع یک ساله آن ۳/۱ و شیوع طول عمر ۴ تا ۷ درصد تخمین زده شده است. حدود ۱۲ درصد از بیمارانی که به کلینیک‌های روان‌پزشکی مراجعه می‌کنند، و تقریباً ۲۵ درصد افراد مراجعه کننده به کلینیک‌های اختلالات اضطرابی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هستند (کسلر، کلر و ویتچن، ۲۰۰۱؛ چانگ و همکاران، ۲۰۱۹). اختلال اضطراب فراگیر باعث اختلال عملکرد شدیدی می‌شود و بدین درمان احتمال بهبودی ضعیفی دارد (داهلین و همکاران، ۲۰۱۶). اکثر پژوهش‌های همه‌گیرشناختی در ایران اختلال اضطراب فراگیر را به عنوان شایع‌ترین اختلال اضطرابی مطرح کرده‌اند (حسینی غفاری، محمدخانی، پورشهباز و دولتشاهی، ۱۳۹۲) و در برخی پژوهش‌های دیگر این اختلال نه تنها شایع‌ترین اختلال اضطرابی، بلکه در بین سایر اختلال‌های روانشناختی، این اختلال به عنوان یکی از مهمترین اختلال‌های ناتوان کننده برای بزرگسالان مطرح شده است (کایچرس و همکاران، ۲۰۱۴؛ لئونارد و آبرامویچ، ۲۰۱۹).

بروز اختلال اضطراب فراگیر آسیب‌های روانشناختی دیگری را نیز در فرد به وجود می‌آورد که می‌تواند فرآیند شناختی، فراشناختی، ارتباطی و اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار دهد (دهشیری، ۱۳۹۱؛ محمودعلیلو، بخشی‌پورودسری، منصوری، فرنام و فخاری، ۱۳۹۰). از طرفی باید اشاره کرد که وقتی فرد به اضطراب

۱. Anxiety

۲. Generalized Anxiety Disorder

۳. worry

اضطراب فراگیر بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال ۱۳۹۶ بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی داوطلبانه و هدفمند استفاده شد. دلیل استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه، عدم دستیابی به جامعه آماری و در نظر گرفتن عدم تمایل بعضی از افراد جامعه آماری جهت شرکت در پژوهش است. بر این اساس، ابتدا به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر تهران مراجعه شد و لیست افرادی که با علائم اضطراب فراگیر به این مراکز مراجعه کرده بودند، اخذ گردید. در گام اول تعداد ۷۹ نفر از ۱۷ مرکز مشاوره معرفی گردید. سپس با ارائه پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر، تعداد ۶۲ نفر از این افراد تشخیص اختلال اضطراب فراگیر را دریافت نمودند. در گام بعد از بین این افراد تعداد ۳۰ نفر با انتخاب تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه گواه). سپس گروه آزمایش مداخلات مربوط به درمان فراشناختی را دریافت نمودند، این در حالی بود که افراد حاضر در گروه گواه در طول انجام فرآیند پژوهش از دریافت این مداخلات بی‌بهره بودند. ملاک‌های ورود به پژوهش شامل داشتن اختلال اضطراب فراگیر، رضایت جهت شرکت در پژوهش و مشاوره‌ای آنها) بود. همچنین ملاک‌های خروج از پژوهش نیز شامل داشتن بیش از دو جلسه غیبت، عدم همکاری و انجام ندادن تکالیف مشخص شده در جلسات آموزشی و عدم تمایل به ادامه حضور در فرآیند انجام پژوهش بود. جهت رعایت اخلاق در پژوهش رضایت افراد برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شدند. هم‌چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرآیند پژوهشی این مداخلات را دریافت خواهند نمود. همچنین به هر دو گروه گواه اطمینان داده شد که اطلاعات آنها محترمانه باقی می‌ماند و نیازی به درج نام نیست. در نهایت، بر روی گروه آزمایش مداخلات درمان فراشناختی انجام شد.

ذوالفقاری و ارشادی متشر، ۱۳۹۸؛ اصلی آزاد، ۱۳۹۶؛ هیدن، روزن، دکر، دامسترا و دین، ۲۰۱۶؛ هجمدار و همکاران، ۲۰۱۶؛ اسپجورن، نورمان، مانکبو، کریستنسن و رین‌هولدت - دان، ۲۰۱۸؛ کاپایانسو، ریوس، موریسون و ولز، ۲۰۱۸.

رویکرد فراشناختی بر این باور است که افراد به این دلیل در دام ناراحتی هیجانی گرفتار می‌شوند که فراشناخت‌های آنها به الگوی خاصی از پاسخ‌دهی به تجربه‌های درونی منجر می‌شوند که موجب تداوم هیجان منفی و تقویت باورهای منفی می‌شود. این الگو نشانگان شناختی توجیهی خوانده می‌شود که شامل نگرانی، نشخوار فکری، توجه ثبیت شده و راهبردهای خودتنظیمی و یا رفتارهای مقابله‌ای ناسازگارانه می‌شود (ولز، ۲۰۰۹). درمان فراشناختی برخلاف درمان شناختی - رفتاری به جای تکیه بر محتوای افکار، به فرآیند پردازش اطلاعات می‌پردازد و معتقد است که توجه سوگیری شده و پردازش‌های معیوب شناختی و فراشناختی همراه با باورهای فراشناختی، علت ابتلا به اضطراب و نگرانی است. بر اساس نظریه فراشناختی ماهیت بسیاری از رفتارهای مقابله‌ای در اختلال اضطراب فراگیر، روانشناختی است (حسینی غفاری و همکاران، ۱۳۹۹). بر اساس مدل فراشناختی، درمان موفق اختلال اضطراب فراگیر باستی بر تعديل چندین عامل فراشناختی تمرکز داشته باشد. این عوامل عبارتند از باورهای نادرست در مورد مهار ناپذیری نگرانی، باورهای منفی در مورد پیامدهای آسیب‌زای نگرانی و باورهای مثبت در مورد سودمندی نگرانی به عنوان سبک مقابله‌ای (هانسپیر، اکسنر، ریف و گلومبیوسکی، ۲۰۱۶).

حال با عطف به پیشینه پژوهشی، مشاهده گردیده که در جامعه‌های آماری گوناگون، درمان فراشناختی بر مؤلفه‌های مختلف روانشناختی تأثیر معنادار داشته است، اما نکته حائز اهمیت این است که هیچ پژوهشی جهت بررسی اثر درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر صورت نگرفته است. بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش کنونی اینگونه مطرح می‌گردد که آیا درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تأثیر دارد؟

روش

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون - پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. متغیرهای مستقل درمان فراشناختی و متغیر وابسته تاب آوری افراد مبتلا به اختلال

ابزار

قابلیت اعتماد مقیاس کانر و دیویسون را با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۹ محاسبه و همچنین درستی آزمایی و قابلیت اعتماد آن را نیز مناسب گزارش کردند. همچنین قابلیت اعتماد این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۹۰ محاسبه گردید. روند اجرای پژوهش: پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام فرآیند نمونه‌گیری (مطابق با آنچه ذکر گردید)، افراد انتخاب شده (۳۰ نفر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر) به شیوه تصادفی در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه گواه). گروه آزمایش مداخلات درمانی مربوط به درمان فراشناسختی (ولز، ۲۰۰۹) را در طی سه ماه به صورت هفتگه‌ای یک جلسه ۹۰ دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی است که افراد حاضر در گروه گواه هیچ گونه مداخله‌ای را در طول پژوهش دریافت نکردند. بسته فراشناسخت درمانی (ولز، ۲۰۰۹) برای افراد دارای اضطراب تهیه شده است. این مداخله‌ای با بهره‌گیری از فنونی همچون همچون به تعویق انداختن نگرانی، چالش با باورهای مربوط به خطر، متوقف کردن مهار رفتارهای اجتنابی، تلاش دارد تا باورهای بیماران مبتلا به اضطراب را تغییر دهد.

خلاصه جلسات فراشناسخت درمانی (با اقتباس از ولز، ۲۰۰۹) جلسه اول) معارفه مفهومی از این اختلال، القای سبک فراشناسختی، آماده‌سازی گروه برای شروع درمان، اجرای آزمایش فرونشانی با فکر.

جلسه دوم) تدوین فرمولبندی موردي، معرفی مدل و آماده‌سازی، اجرای آزمایش فرونشانی با فکر، شروع چالش با باور مربوط به مهارناپذیری، تمرین ذهن آگاهی گسلیده، معرفی به تعویق انداختن نگرانی، تکلیف خانگی، تمرین ذهن آگاهی گسلیده و به تعویق انداختن نگرانی.

جلسه سوم) مرور تکلیف خانگی، ادامه آماده سازی درصورت نیاز، اسناد مجدد کلامی و رفتاری - مهارناپذیری، تکلیف خانگی، ادامه به تعویق انداختن نگرانی و معرفی آزمایش از دست دادن مهار. جلسه چهارم) مرور تکلیف خانگی، ادامه چالش با باور مهارناپذیری (ارائه شواهد مختلف)، اجرای آزمایش از دست دادن مهار در جلسه درمان، بررسی و متوقف کردن مهار غیرانطباقی و رفتارهای اجتنابی، تکلیف خانگی، ادامه به تعویض انداختن نگرانی

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر^۱: پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر توسط اسپیترر، کرونک، ویلیامز و لاو (۲۰۰۶) تهیه شده و دارای ۷ سؤال است. طیف پاسخگویی به صورت لیکرت و گرینه‌ها به صورت هیچ وقت، چندروز، بیش از نیمی از روزها و تقریباً هر روز از ۰ تا ۳ نمره گذاری می‌شوند. گستره نمره مقیاس از ۰ تا ۲۱ می‌باشد. کسب نمره بالاتر ۱۱ نشانگر وجود اختلال اضطراب فراگیر در فرد است. اسپیترر و همکاران (۲۰۰۶) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی مقیاس را به ترتیب ۰/۹۲ و ۰/۸۳ گزارش کردند. درستی همگرای پرسشنامه با پرسشنامه‌های اضطراب بک، چک لیست نشانه‌های روانی ۹۰ سؤالی، پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب همبستگی نمره مقیاس اضطراب فراگیر با پرسشنامه‌های اضطراب بک ۰/۷۲، چک لیست نشانه‌های روانی ۹۰ سؤالی و پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت و ابعاد آن بین ۰/۳۰ برای بعد عملکرد جسمی تا ۰/۷۵ برای بعد سلامت روانی بدست آمده است. در پژوهشی بر روی دانشجویان ایرانی و نمونه بالینی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود یک عامل با درصد تبیین ۵۳ درصد بود. ضریب همبستگی مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر با پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اسپیلبرگر ۰/۷۱ (برای حالت) و ۰/۵۲ (برای صفت) و با خرد مقیاس اضطراب ۱۲ ماده‌ای از چک لیست نشانه‌های بالینی ۰/۶۳ بدست آمده است. ضریب همبستگی مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر و بعد سلامت روانی پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت عمومی ۰/۲۸ - ۰/۲۸ بدست آمد (نائینیان، شعیری، شریفی‌نیا و هادیان، ۱۳۹۰).

مقیاس تاب آوری^۲: مقیاس تاب آوری توسط کانر و دیوید سون در سال ۲۰۰۳ جهت سنجش میزان تاب آوری افراد طراحی شد. این مقیاس دارای ۲۵ گویه می‌باشد که آزمودنی‌ها پاسخ دخود را بر روی یک مقیاس ۴ درجه‌ای لیکرت از کاملاً نادرست (صفراً) تا همیشه درست (۴) مشخص می‌کردند. امتیاز کل در این آزمون از ۰ تا ۱۰۰ است، در این مقیاس نمرات بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتر در شخص می‌باشد. کانر و دیوید سون (۲۰۰۳) ثبات درونی مقیاس تاب آوری را با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۹ و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن را ۰/۸۷ گزارش نمودند. محمدی (۱۳۸۴)،

². Resilience Scale

¹. General Anxiety Disorder Questionnaire

جلسه دهم) مرور تکلیف خانگی، کار بر روی برنامه درمان (جلوگیری از عود)، تقویت برنامه جایگرین و توضیح روش آن بامثال، برنامه ریزی جلسات تقویتی، تکلیف خانگی: مشخص کردن کاربردهای مداوم درمان.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس‌ها استفاده شد. در نهایت جهت بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراغیر از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

یافته‌های حاصل از داده‌های جمعیت شناختی بیانگر آن بود که بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش زن بودند (۶۷ درصد). همچنین افراد شرکت کننده در پژوهش دارای دامنه سنی ۴۹ تا ۳۲ سال بودند که در این بین میانگین و انحراف معیار سن آن‌ها $5/11 \pm 5/42$ بود. حال ابتدا به بررسی یافته‌های افراد مربوط به لیسانس (۳۲٪) بود. حال ابتدا به بررسی یافته‌های توصیفی پژوهشی پرداخته می‌شود.

جدول ۱. نتایج آمار توصیفی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری						
مؤلفه‌ها	گروه‌ها	پیش آزمون				
		میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	پیش آزمون
تاب آوری	گروه آزمایش	۵/۷۴	۵۲/۶۰	۶/۰۶	۵۰/۳۳	۶/۷۵
	گروه گواه	۵/۲۸	۴۱/۲۰	۵/۷۲	۴۲/۰۶	۵/۵۵

واریانس‌ها را رعایت شده است ($p < 0/05$). از طرفی نتایج آزمون انسان داد که تفاوت نمره‌های پیش آزمون گروه‌های آزمایش و گروه گواه در متغیر وابسته (تاب آوری) معنادار نبوده است ($p > 0/05$). همچنین نتایج آزمون موخلی بیانگر آن بود که پیش‌فرض کرویت داده‌ها در متغیر تاب آوری را رعایت شده است ($p < 0/05$).

و وارونه‌سازی رفتارهای اجتناب از نگرانی، آزمایش از دست دادن مهار.

جلسه پنجم) مرور تکلیف خانگی، ادامه چالش با باور مهار ناپذیری در صورت نیاز، شروع چالش با باورهای مربوط به خطر، تلاش برای از دست دادن مهار یا صدمه زدن به خود از طریق آزمایش نگرانی، ادامه چالش با باور مربوط به خطر، تکلیف خانگی: آزمایش‌های رفتاری برای چالش با باور مربوط به خطر.

جلسه ششم و هفتم) مرور تکلیف خانگی، ادامه چالش با باور مربوط به خطر، تأکید بر معکوس کردن هرگونه راهبردهای غیرانطباقی باقیمانده تکلیف خانگی، آزمایش‌های غیرانطباقی باقیمانده، شروع چالش با باورهای مثبت، در صورت رسیدن باورهای منفی به صفر، تکلیف خانگی: آزمایش‌های رفتاری برای چالش با باور مربوط به خطر و اجرای راهبرد عدم تناسب و سایر آزمایش‌های رفتاری برای چالش با باورهای مثبت.

جلسه هشتم) مرور تکلیف خانگی، ادامه چالش با باورهای مثبت، اجرای راهبرد عدم مطابقت در جلسه درمان، تکلیف خانگی: آزمایش‌های رفتاری (مثل آزمایش افزایش و کاهش سطح نگرانی). جلسه نهم) مرور تکلیف خانگی، کار روی معکوس کردن علائم باقیمانده، اجرای راهبرد عدم تناسب در جلسه درمان. ادامه چالش با باورهای مثبت، تکلیف خانگی: درخواست از بیمار برای نوشتن برگه خلاصه درمان.

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازه‌گیری مکرر، پیش‌فرض‌های آزمون‌های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمونه‌ای داده‌ها در متغیر تاب آوری در گروه‌های آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برقرار است ($f = 0/69$, $f = 0/45$, $p < 0/05$; $f = 0/45$, $p < 0/05$). همچنین پیش‌فرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته می‌داد پیش‌فرض همگنی

جدول ۲. تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر جهت بررسی تأثیرات درون و بین گروهی برای مؤلفه تاب آوری							
				مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	مقدار f
			توان آزمون	مقدار p	اندازه اثر	مقدار f	میانگین مجذورات
۱	۰/۴۲	۰/۰۰۰۱	۱۹/۹۸	۳۳۸/۱۴	۲	۶۷۶/۲۹	مراحل
۰/۷۳	۰/۲۱	۰/۰۱	۷/۵۱	۴۵۳/۳۷	۱	۴۵۳/۳۷	گروه‌بندی
۱	۰/۵۸	۰/۰۰۰۱	۳۹/۰۷	۶۶۱/۰۸	۲	۱۳۲۲/۱۵	تعامل مراحل و گروه‌بندی
				۱۶/۹۲	۵۶	۹۴۷/۵۵	خطا

گردد. همچنین این پژوهشگران به تأثیر فراشناخت در مانی بر اختلال اضطراب اجتماعی فرآگیر اذعان نموده‌اند. از طرفی عاشری (۱۳۹۴) در پژوهش خود اشاره کرده که فراشناخت درمانی می‌تواند در بهبود بر نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر کاربرد بالینی داشته باشد.

در تبیین اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر باید گفت فراشناخت دارای راهبردهایی است که افراد از آنها برای تنظیم و مهار فرآیندهای تفکر استفاده می‌کنند. چنان‌که فراشناخت‌های غلط همچون باورهای منفی نسبت به مهار ناپذیری علائم اختلال‌های روانشناسی همچون اختلال اضطراب فرآگیر، بیشترین همبستگی را با مجموعه‌ای از مقیاس‌های مرتبط با آسیب‌پذیری داشته (همدان و همکاران، ۲۰۱۶) و سبب می‌شود که فرد علائم بالینی بیشتری را در اختلال درک و گزارش نماید. بر این اساس آموزش راهبردهایی نظری نظارت و سازماندهی در قالب جلسات فراشناخت سبب می‌شود تا این افکار چالش گردد. همچنین باید اشاره کرد که فراشناخت‌های ناکارآمد برای فرد باورهای نارضایتی را ایجاد می‌کند (کاپایانسو و همکاران، ۲۰۱۸). در باورهای نارضایتی افراد برای جلوگیری از فاجعه افکار خود را سرکوب کرده و یا تلاش می‌کنند به شیوه دیگری فکر کنند. واضح است که اینگونه افکار خطرناک بوده و سبب دامن زدن به علائم بالینی بیماری و تشدید علائم بالینی می‌گردد (اسبجورن و همکاران، ۲۰۱۸). بر این اساس درمان فراشناخت با اصلاح فرآیند فراشناخت‌های ناکارآمد روند سرکوب افکار را مهار کرده و بجای آن فراشناخت‌های سازگارانه همچون باورهای مثبت و خودآگاهی شناختی را جایگزین نموده و سبب بهبود تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر می‌گردد.

علاوه بر این باید اشاره کرد که مطابق با یافته هجمدان و همکاران (۲۰۱۷) که نشان از تأثیر درمان فراشناختی بر مؤلفه‌های روانشناسی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر داشت، درمان

نتایج جدول تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در جدول ۲ نشان می‌دهد که میانگین نمرات تاب آوری فارغ از تأثیر گروه‌بندی در طی مراحل پس آزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر با مقایسه با پیش آزمون یک تفاوت معنادار به شمار می‌رود. از طرفی نتایج سطر دوم جدول فوق بیانگر آن است که متغیر گروه بندی (درمان فراشناختی) فارغ از مراحل (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر دارای تأثیری معنادار بوده است. بدین معنا که اثر درمان ذهن آگاهی در مقایسه با گروه گواه تأثیر معنادار بوده است. در نهایت اما سطر مرتبه به تعامل مراحل و گروه‌بندی حاکی از آن است که درمان فراشناختی با تعامل مراحل نیز تأثیر معناداری بر مراحل آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) مؤلفه تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که ۵۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته (تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر) توسط تعامل متغیر مراحل و گروه‌بندی تبیین می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که درمان فراشناختی بر تاب آوری بیماران افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر مؤثر بوده است. علاوه بر این نتایج نشان داد که این درمان توانسته تأثیر خود را در زمان نیز به شکل معناداری حفظ نماید.

یافته پژوهش حاضر با یافته شفیعی شنگ‌آتش و همکاران (۱۳۹۱)؛ اصلی‌آزاد و همکاران (۱۳۹۳)؛ عاشری (۱۳۹۴)؛ هیدن و همکاران (۲۰۱۶)؛ هجمدان و همکاران (۲۰۱۶)؛ اسبجورن و همکاران (۲۰۱۸)؛ کاپایانسو و همکاران (۲۰۱۸) همسو است. چنان‌که هجمدان و همکاران (۲۰۱۶) در پژوهشی نشان داد که فراشناخت درمانی می‌تواند منجر به کاهش اضطراب و افسردگی

فزوون کنشی و افزایش توجه کودکان دبستانی مبتلا به فزوون کنشی و اختلال نارسایی توجه. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، ۱۶(۱)، ۵۷-۴۸.

بشارت، محمدعلی؛ حافظی، الهه؛ رنجبر شیرازی، فرزانه و رنجبری، توحید (۱۳۹۷). مقایسه ناگویی هیجانی و مکانیسم‌های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب فرآگیر، و سوساس فکری - عملی و جمعیت عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناسی، ۱۷(۶۶)، ۱۹۹-۱۷۶.

حسینی غفاری، فاطمه؛ محمدخانی، پروانه؛ پورشهباز، عباس و دولتشاهی، بهروز (۱۳۹۲). اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر باورهای فراشناختی، نگرانی و حوزه‌های نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر، مجله روانشناسی بالینی، ۵(۱)، ۲۱-۱۰.

دهشیری، غلامرضا (۱۳۹۱). اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر، روانشناسی بالینی، ۲(۲)، ۲۸-۱۹.

دوستی، مرضیه؛ پورمحمدزادی تجربی، معصومه و غباری بناب، باقر (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانشناسی دختران خیابانی دارای اختلال‌های برونی سازی شده، روانشناسی تحولی، ۱۱(۴۱)، ۵۴-۴۳.

ذوالقاری، حسین و ارشادی‌منش، سودابه (۱۳۹۶). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی (SQP4R) در دانش فراشناختی دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناسی، ۱۶(۶۳)، ۳۸۶-۴۰۱.

سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ محمدخانی، شهرام و کرمی، غلامرضا (۱۳۹۳). ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، و علایم و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر (GAD)، دوماهنامه علمی پژوهشی فیض، ۱۸(۵)، ۳۹-۴۲.

شفیعی سنگ آتش، سمية؛ رفیعی‌نیا، پروین و نجفی، محمود (۱۳۹۱). اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فرآگیر، مجله روانشناسی بالینی، ۴(۴)، ۳۱-۱۹.

عاشری، جمال (۱۳۹۴). تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فرآگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران، نسیم تندرنستی، ۴(۲)، ۲۴-۱۸.

قلی‌پور، زهرا؛ مرعشی، سیدعلی؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز و ارشدی، نسرین (۱۳۹۵). تاب آوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی، روانشناسی تربیتی، ۱۲(۳۹)، ۱۵۵-۱۳۵.

فراشناختی با آموزش راهکار جایه‌جایی کانون توجه از محرك آزارنده و اضطراب آور به سایر محرك‌های خنثی و بکارگیری راهکار به تعویق انداختن نگرانی به طور موقت، باعث می‌شود تا فرد بتواند در این فرآیند قدرت مقابله‌ای خود را افزایش داده و تاب آوری بیشتری را در مواجهه با اضطراب ناشی از این اختلال بازیابد.

پژوهش حاضر، مانند هر پژوهش دیگر با محدودیت‌هایی نظیر محدود بودن نتایج پژوهش به گروه و منطقه جغرافیایی خاص (بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر شهر تهران)، عدم همکاری بعضی از مراکز مشاوره، عدم تمایل بعضی از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر جهت شرکت در پژوهش، عدم استفاده از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی، عدم بهره‌گیری از ابزارهای پژوهشی دیگر به جز پرسشنامه و تعداد کم نمونه پژوهش مواجه بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که نظریه این پژوهش در جامعه آماری دیگر، سایر مناطق جغرافیایی، بهره‌گیری از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی و با حجم نمونه بیشتر انجام گردد تا سبب افزایش تعمیم یافته‌ها شود. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر توصیه می‌گردد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر، در مراکز درمانی و مشاوره از درمان فراشناختی برخوردار گرددند تا بدین طریق میزان تاب آوری آنها افزایش یابد.

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر که بر تأثیر معنادار درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر دلالت داشت، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به منظور بهبود تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر می‌توان از درمان فراشناختی بهره مند گردید.

منابع

اصلی‌آزاد، مسلم (۱۳۹۸). تعیین اعتبار محتوا‌یی بسته آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان محور و مقایسه اثربخشی آن با فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عالم و سوساس، خلاقیت هیجانی، تنظیم شناختی هیجان، تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل دانش آموزان دارای اختلال و سوساس فکری - عملی شهر اصفهان. رساله دوره دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خواراسکان).

اصلی‌آزاد، مسلم؛ فرامرزی، سالار؛ عارفی، مژگان؛ فرهادی، طاهره و فکار، عاطفه (۱۳۹۳). اثر آموزش دانش فراشناختی بر کاهش

- Esbjorn, B.H., Normann, N., Munkebo, B., Christiansen, B.M., Reinholdt-Dunne, M.L. (2018). The efficacy of group metacognitive therapy for children (MCT-c) with generalized anxiety disorder: An open trial, *Journal of Anxiety Disorders*, 53, 16-21.
- Hansmeier, J., Exner, C., Rief, W., Glombiewski, J.A. (2016). A test of the metacognitive model of obsessive-compulsive disorder. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 10, 42-48.
- Hayes-Skelton, S.A., Roemer, L., Orsillo, S.M. (2013). A randomized clinical trial comparing an acceptance-based behavior therapy to applied relaxation for generalized anxiety disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 81 (5), 761-773.
- Heiden, C.V.D., Rossen, K.V., Dekker, A., Damstra, M., Deen, M. (2016). Metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder: A pilot study, *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 9 (1), 24-29.
- Hjemdal, O., Hagen, R., Solem, S., Nordahl, H., Kennair, L.E.O., Ryum, T., Nordahl, H.M., Wells, A. (2016). Metacognitive Therapy in Major Depression: An Open Trial of Comorbid Cases, *Cognitive and Behavioral Practice*, 24(3), 312-318.
- Kessler, R.C., Keller, M.B., Wittchen, H.U. (2001). The Epidemiology of Generalized Anxiety Disorder. *Psychiatric Clinics of North America*, 24 (1), 19-39.
- Leonard, K., Abramovitch, A. (2019). Cognitive functions in young adults with generalized anxiety disorder. *European Psychiatry*, 56, 1-7.
- Lieb, R., Becker, E., Altamura, C. (2005). The epidemiology of generalized anxiety disorder in Europe. *European Neuropsychopharmacology*, 15 (4), 445-452.
- Lou, Y., Taylor, E.P., Di Folco, S. (2018). Resilience and resilience factors in children in residential care: A systematic review. *Children and Youth Services Review*, 89, 83-92.
- Maulding, W., Peters, G.B., Roberts, J., Leonard, E., Sparkman, L. (2012). *Emotional intelligence resilience in children and adolescents: Processes, mechanisms and interventions*. Cambridge: Cambridge University Press, 354-386.
- Mylant, M., Tde, B., Cuaves, E., Meehan, M. (2002). Adolescent children of alcoholics: Vulnerable or resilience? *Journal of American Psychiatry*, 8 (2), 57-64.
- Oshio, A., Taku, K., Hirano, M., Saeed, G. (2018). Resilience and Big Five personality traits: A meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 127, 54-60.
- Spitzer, R.L., Kroenke, K., Williams, J. B., Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of internal medicine*, 166 (10), 1092-1097.
- Wells, A. (2009). *Metacognitive therapy for anxiety and depression*. New York: The Guilford Press.
- محمدی، مسعود (۱۳۸۴). بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پایان نامه دکتری، چاپ نشده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
- محمودعلیلو، مجید؛ بخشی پور رود سری، عباس؛ منصوری، احمد؛ فرنام، علیرضا و فخاری، علی (۱۳۹۰). مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فraigir، اختلال وسواس - اجبار، اختلال افسردگی عمدہ و افراد بهنجار، مطالعات روانشناختی، ۷ (۴)، ۵۵-۷۴.
- نائینیان، محمدرضا؛ شعیری، محمدرضا؛ شریفی نیا، معصومه و هادیان، مهری (۱۳۹۰). بررسی پایانی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فraigir (GAD-7). روانشناسی بالینی و شخصیت، ۳ (۴)، ۴۱-۵۰.
- Amir, N., Taboas, W., Montero, M. (2019). Feasibility and dissemination of a computerized home-based treatment for Generalized Anxiety Disorder: A randomized clinical trial. *Behavior Research and Therapy*, 120, 103-109.
- Capobianco, L., Reeves, D., Morrison, A.P., Wells, A. (2018). Group Metacognitive Therapy vs. Mindfulness Meditation Therapy in a Transdiagnostic Patient Sample: A Randomised Feasibility Trial. *Psychiatry Research*, 259, 554-561.
- Chang, S., Abdin, E., Shafie, S., Sambasivam, R., Vaingankar, J.A., Ma, S., Chong, S.A., Subramaniam, M. (2019). Prevalence and correlates of generalized anxiety disorder in Singapore: Results from the second Singapore Mental Health Study. *Journal of Anxiety Disorders*, 66, 102-108.
- Conner, K.M., Davidson, J.R.T. (2003). Development of a new resilience scale: The conner -Davidson Resilience scale (CD-RISC). *Depression & Anxiety*, 18 (2), 36-82.
- Cuijpers, P., Sijbrandij, M., Koole, S., Huibers, M., Berking, M., Andersson, G. (2014). Psychological treatment of generalized anxiety disorder: a meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 34(2), 130-140.
- Dahlin, M., Ryberg, M., Vernmark, K., Annas, N., Carlbring, P., Andersson, G. (2016). Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study. *Internet Interventions*, 6, 16-21.
- Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U., & Helliwell, J. (2009). *Well-being for Public Policy*. New York: Oxford University Press.